

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-13/ნ  
2013 წლის 18 მარტი

ქ. თბილისი

**„პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 25 ივნისის №183/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე**

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:  
**მუხლი 1**

„პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 25 ივნისის №183/ნ ბრძანებაში (სსმ III, 28.06.2010 №75 მუხ.1100) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ბრძანებით დამტკიცებული დანართის („პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი“, იმუნიზაციის მართვისათვის საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმები და წესები):

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი“ და იმუნიზაციის მართვის წესები“;

ბ) მე-2 მუხლის 42-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

გ) მე-2 მუხლის 50-ე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ გ) IV დონე – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.“;

დ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი

ვაქცინა	ასაკი									
	0-12 საათი	0-5 დღე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	12 თვე	18 თვე	5 წელი	14 წელი	
1 ბცქ (BCG)		X								
2 ჰეპ B (HepB)	X									
3 დიფთერია-ტეტანუსი-ყივანახველა-ჰეპ B- ჰიბ (DPT-HepB-Hib)			X	X	X					
4 დიფთერია-ტეტანუსი-ყივანახველა (DPT)							X			
5 ოპვ/იპვ (OPV/IPV)			X	X	X		X	X		
6 წითელა-წითურა-ყბაყურა (MMR)						X		X		
7 დიფთერია-ტეტანუსი (DT)								X		
8 ტეტანუსი-დიფთერია (TD)*									X	
9 როტავირუსული ვაქცინა (Rota)			X	X						



10	პნევმოკოკური (Pneumo)	სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აცრების დაწყების კონკრეტული წელი და აცრადაქვემდებარებული ასაკობრივი კონტინგენტები განისაზღვრება სპეციალური სამინისტროს ცალკე ბრძანებით
11	ადამიანის პაპილომა ვირუსული (HPV)	
12	ჩუტყვა ვილა (VZV)	

შენიშვნა: \* TD - შემდეგ ყოველ მე-10 წელს, 55 წლის ასაკამდე“;

**ე) მე-4 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:**

„8. როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო ცოცხალი ვაქცინით ვაქცინაცია იწყება 2 თვის ასაკიდან. აცრების კურსი არის ორჯერადი:

ა) როტავირუსული ვაქცინის პირველი დოზა უნდა გაკეთდეს 8 კვირის ასაკიდან 15 კვირის ასაკამდე;

ბ) როტავირუსული ვაქცინის მეორე დოზა უნდა გაკეთდეს 12 კვირის ასაკიდან 24 კვირის ასაკამდე;

გ) პირველ და მეორე დოზას შორის მინიმალური ინტერვალია 4 კვირა;

დ) ვაქცინის მოხმარება ხდება ორალურად (პირის ღრუში ჩაწვეთებით) და ერთი ასაცრელი დოზა შეადგენს 1,5 მლ.“;

**ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:**

„მუხლი 9. ვაქცინების მოხმარება\*: მეთოდი, დოზა

ვაქცინა	დოზა	შეყვანის მეთოდი
დტ, დტ, ტდ (DPT, DT Td)	0,5 მლ	ინტრამუსკულარული
ჰიბ (Hib)	0,5 მლ	ინტრამუსკულარული
ჰეპატიტი B (HEPB)	≤ 19წ. 0,5 მლ ≥ 20წ. 1.0 მლ	ინტრამუსკულარული
ჰეპატიტი A (HEPA)	≤ 18წ. 0,5 მლ ≥ 19წ. 1.0 მლ	ინტრამუსკულარული
ადამიანის პაპილომა ვირუსი (HPV)	0,5 მლ	ინტრამუსკულარული
გრიპი ცოცხალი ატენუირებული (LAIV)	0,2 მლ	ინტრანაზალური შესასხურებელი
გრიპი სამვალენტური ინაქტივირებული (TIV)	6-35თვე 0,25მლ > 3წ. 0,5მლ	ინტრამუსკულარული
წითელა, წითურა, ყბაყურა (MMR)	0,5 მლ	კანქვეშ
მენინგოკოკური - კონიუგირებული (MCV)	0,5 მლ	ინტრამუსკულარული
მენინგოკოკური - პოლისაქარიდული (MPSV)	0,5 მლ	კანქვეშ
პნევმოკოკური - კონიუგირებული (PCV)	0,5 მლ	ინტრამუსკულარული
პნევმოკოკური - პოლისაქარიდული (PPSV)	0,5 მლ	ინტრამუსკულარული ან კანქვეშ
პოლიო ცოცხალი (OPV)	2 წვეთი	ორალური
პოლიო ინაქტივირებული (IPV)	0,5 მლ	ინტრამუსკულარული ან კანქვეშ
ბცე (BCG)	0,05 მლ	კანში



როტავირუსული ვაქცინა (Rota)	1,5 მლ	ორალური
ჩუტყვავილა (VZV)	0,5 მლ	კანქვეშ
<b>კომბინირებული ვაქცინები</b>		
დეტ+ჰიბ+ჰეპ, დეტ+ჰიბ+იპე+ჰეპბ დეტ+ჰიბ, ჰიბ+ჰეპბHB	0,5 მლ	ინტრამუსკულარული
აჰეპ+ბჰეპ (HEPA+HEPB)	≥ 18წ 1.0 მლ	ინტრამუსკულარული
წწყ+ჩუტყვავილა (MMR+Var)	≤12წ. 0,5 მლ	კანქვეშ

ზ) მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს დაემატოს „ბ.ფ“ და „ბ.ქ“ ქვეპუნქტები შემდეგი რედაქციით:  
„ბ.ფ. - ნაწლავის ინვაგინაცია;

ბ.ქ. - გასტროენტერიტული სიმპტომები და ნიშნები.“;

თ) მე-12 მუხლს დაემატოს მე-10 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:

10. როტავირუსული ვაქცინა (ROTA)	<p><b>უკუჩვენება*:</b></p> <p>ჰიპერსენსიტიური რეაქცია ვაქცინის პირველი დოზის მიღების შემდეგ;</p> <p>ნაწლავის ინვაგინაცია ანამნეზში;</p> <p>ასიმპტომური აივ ინფექცია;</p> <p><b>გაფრთხილება*:</b></p> <p>6 კვირაზე ნაკლებ ასაკში ვაქცინაცია არ ტარდება;</p> <p>დიარეა და/ან ღებინება რეჰიდრატაციული თერაპიით;</p> <p><i>*როტავირუსულ ვაქცინაზე ვრცელდება მე-12 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებში აღნიშნული უკუჩვენებები და გაფრთხილებები.</i></p>
---------------------------------	--

..

2. ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმები (№№1.3; 063, 1.4; 1.8; 1.9; 2.3; 2.8; 2.9; 2.10;) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

## მუხლი 2

ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს შრომის,  
ჯანმრთელობისა და სოციალური  
დაცვის მინისტრი

დავით სერგეენკო

